

Tod der Mütter in der K. Universitäts-Frauenklinik zu München

vom 1. Januar 1897 bis 31. Dezember 1911.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde

in der gesamten Medizin,

verfaßt und einer

Hohen medizinischen Fakultät der K. Bayer.
Ludwig-Maximilians-Universität zu München

vorgelegt von

Philipp Wehner,

cand. med. aus Werneck.

München 1913.

Buchdruckerei und Verlagsanstalt Carl Gerber.

Tod der Mütter in der K. Universitäts-Frauenklinik zu München

vom 1. Januar 1897 bis 31. Dezember 1911.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde

in der gesamten Medizin,

verfaßt und einer

Hohen medizinischen Fakultät der K. Bayer.
Ludwig-Maximilians-Universität zu München

vorgelegt von

Philipp Wehner,

cand. med. aus Werneck.



München 1913.

Buchdruckerei und Verlagsanstalt Carl Gerber.

Gedruckt mit Genehmigung der Medizinischen Fakultät
der Universität München.

Referent: Geheimrat Prof. Dr. Döderlein.

Meinen Eltern.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Schon verschiedene Arbeiten sind über das Thema „Mortalität im Wochenbett“ aus der Münchener Universitäts-Frauenklinik hervorgegangen. Die letzte dieser Art, von Peter Krings verfaßt, beschäftigt sich vor allem mit dem Zeitraum vom 1. Januar 1900 bis zum 31. September 1907.

In den letzten fünf Jahren haben sich jedoch einschneidende Veränderungen in den Verhältnissen der Münchener Frauenklinik ergeben. Nicht nur, daß die Leitung wechselte, hat sich die Frequenz der Anstalt in den letzten Jahren in einer Weise gehoben, daß die Aufnahmeziffer heute das Doppelte der früheren übersteigt. München nähert sich mit Riesenschritten der Millionenstadt; dies und die günstigen Verkehrsverbindungen mit der Umgebung bringen es mit sich, daß auch das eingelieferte Krankenmaterial heute ein anderes sein wird, wie früher.

Die Art des Krankenmaterials bestimmt aber in der Hauptsache die Mortalitätshöhe in den großen Entbindungsanstalten.

Hat sich das Krankenmaterial unter den neuen Verhältnissen geändert, wie hat es sich geändert und welchen Einfluß haben diese Änderungen auf die Mortalität ausgeübt? Um diese Fragen zu beantworten, ist ein Vergleich mit früheren Zeitabschnitten nötig. Ich habe deshalb bis auf das Jahr 1897 zurückgegriffen. Zwar liegen über den Zeitpunkt 1897—1907 schon Bearbeitungen des Themas vor (die puerperalen Todesfälle der Münchener Frauenklinik 1897—1899 von Karl Wilmes sowie die Arbeit von Peter Krings von 1900—1907), jedoch glaube ich, wenn Vergleiche einen Wert haben sollen, müssen vor allem die vergleichenden Zeiträume ungefähr gleich groß sein. Da dies bei den vorliegenden Arbeiten nicht der Fall war, mußte eine Neubearbeitung erfolgen.

Um über die Art und Weise des Krankenmaterials Aufschluß zu bekommen, ist neben dem Alter der Gebärenden auch die Zahl der Geburten, namentlich ob Erst- oder Mehrgebärende zu beachten.

Die ausgeführten Operationen, die vorgekommenen Komplikationen im Geburts- und Wochenbettsverlauf, in Vergleich gestellt zu den Todesfällen, lassen erst eine richtige Beurteilung dieser zu, daher mußten in nachfolgender Arbeit nicht nur die Todesfälle an sich verzeichnet werden, sondern auch Alter, Geburtenzahl, Geburts- und Wochenbettkomplikationen und die dabei ausgeführten Operationen der Frauen in Betracht gezogen werden. Betont soll noch sein, daß sich nachfolgende Zahlen nur auf die Universitätsklinik ohne Hebammenschule beziehen.

Der 15 jährige Abschnitt von 1897—1911 inkl. wurde in ungefähr drei gleichgroße Abschnitte geteilt.

Der erste Abschnitt läuft vom 1. Januar 1897 bis 31. Dezember 1901. Während dieser Zeit wurden auf der geburtshilflichen Abteilung der K. Universitäts-Frauenklinik (ohne Hebammenschule) entbunden:

6288 Frauen.

Ganz oder zum Teil entbunden eingeliefert wurden: 202 Frauen, die Frequenz der Anstalt betrug also: 6490.

Auf die einzelnen Jahre verteilen sich diese Geburten in folgender Weise:

Jahre	Geburten
1897	1146
1898	1268
1899	1343
1900	1498
1901	1235

Von diesen Frauen waren:

Erstgebärende . . 3128 = 48,3 %

Mehrgebärende . . 3246 = 51,7 %

Dem Alter nach waren:

Unter 30 Jahren . . 5498 = 84,7 %

Über 30 Jahre . . 992 = 15,3 %

Von den Erstgebärenden waren 131 über 30 Jahre = 4,2 % der Erstgebärenden.

Von diesen 6490 Frauen kamen 56 ad exitum. Dies entspricht einer Gesamtmortalität von 0,8 %.

Auf die einzelnen Jahre verteilen sich die Todesfälle in folgender Weise:

Jahre	Geburten	Todesfälle	Mortalitätsprozent
1897	1146	12	1,05 %
1898	1268	7	0,56 %
1899	1343	11	0,82 %
1900	1498	10	0,67 %
1901	1235	16	1,03 %

(Graphische Darstellung siehe Beilage Tafel I)

Als Todesursachen konnten folgende ermittelt werden:

Sepsis	21
Eklampsie	10
Uterusruptur	9

Verblutungen infolge:

Placenta praevia	3
Atonia uteri	3
Nephritis	2
Embolie	1
Miliartuberkulose	1
Perniciöse Anaemie	1
Komplikationen	3
Nach Operationen	2

Auf die einzelnen Jahre verteilen sich die einzelnen Todesfälle und machen von der Frequenz in Prozents aus:

	Im Jahre							
	1897	%	1898	%	1899	%	1900	%
Geburtenzahl	1146	—	1268	—	1343	—	1498	—
Sepsis	4	0,35	2	0,16	4	0,28	3	0,28
Eklampsie	1	0,09	1	0,08	1	0,07	3	0,21
Uterusruptur	2	0,18	2	0,16	3	0,21	1	0,07
Placenta praev.	1	0,09	—	—	1	0,07	—	—
Atonia uteri	1	0,09	1	0,08	—	—	1	0,07
Nephritis	1	0,09	—	—	—	—	—	—
Embolie	1	0,09	—	—	—	—	—	—
Miliartuberkulose	—	—	—	—	1	0,07	—	—
Perniciöse Anaemie	—	—	—	—	1	0,07	—	—
Komplikationen	—	—	—	—	—	—	1	0,07
Nach Operationen	1	0,09	1	0,08	—	—	—	—

Von den 56 Gestorbenen waren:

Erstgebärende . . . 16 = 31,3 %

Mehrggebärende . . . 35 = 68,7 %

Ohne Angabe in der Krankengeschichte 5

Die Mehrggebärenden sind bei den Gestorbenen bei weitem die Mehrzahl.

Dem Alter nach waren:

Unter 30 Jahren . . . 35 = 68 %

Über 30 Jahre . . . 16 = 32 %

Ohne Angabe . . . 5

Eine besondere Bevorzugung älterer Frauen ist nicht erkenntlich.

Nach dem Zeitpunkte des Todes geordnet verschieden:

Unentbunden 4

Wenige Stunden nach der Geburt 16

Im weiteren Verlauf 31

Ohne Krankengeschichte 5

Zur richtigen Beurteilung der Mortalitätshöhe einer Anstalt ist es nötig, auch auf die Zahl der ausgeführten Operationen etwas näher einzugehen.

In der Zeit vom 1. Januar 1897 bis 31. Dezember 1901 wurden an der Münchner Frauenklinik 559 größere Operationen ausgeführt. Dies ergibt eine Operationsfrequenz von 8,6 %.

Die Operationen waren folgende:

Forceps 239

Wendung ev. mit Extraktion 119

Perforation, Dekapitation, Kranioclafie usw. 39

Epifiotomie 16

Künstliche Frühgeburt 12

Sectio caesarea 7

Laparotomie 1

Amputatio cervicis 1

Coeliotomie 1

Repositio uteri inversi 1

Manuelle Plazentalöfung 19

Curettement 4

Extraktion 100

Bei den 56 mit dem Tod abgegangenen Frauen wurden folgende Operationen ausgeführt:

Forceps	9
Wendung ev. mit Extraktion	7
Perforation, Dekapitation, Kranioclasie .	3
Sectio caesarea	1
Laparotomie	1
Manuelle Plazentalöfung	5

Demnach wurden 47 % der Gestorbenen operiert oder fast sechsmal soviel als die allgemeine Operationsfrequenz angibt.

Die Mortalität sämtlicher Operierten betrug 4,7 %.

Drei Todesursachen, die, wie überall auch an der Münchener Anstalt die meisten Opfer forderten, wollen wir noch eingehender besprechen — Sepsis, Eklampsie und Uterusruptur.

An puerperaler Infektion gingen während der 5 Jahre 21 Frauen zugrunde.

Von der Gesamtfrequenz 0,32 %

Von den Verstorbenen überhaupt 38 %.

Die meisten Opfer forderte also das Puerperalfieber (vergl. auch graphische Beilage).

Von diesen 21 Frauen waren bei ihrer Ankunft in der Klinik schon 5 infiziert — entweder hatten sie außerhalb Schüttelfrost gehabt oder waren vom Arzt oder Hebamme innerlich untersucht worden und wurden mit Fiebertemperaturen eingeliefert; bei einer fehlte die Krankengeschichte.

Dadurch wird die Infektionsmortalität der Anstalt ermäßigt auf 0,23 %.

Von den verstorbenen Müttern waren:

Erstgebärende . . .	6	31,6 %
Mehrgebärende . . .	13	68,4 %
Ohne Angabe . . .	2	

Dem Alter nach waren:

Unter 30 Jahren . .	62	63,2 %
Über 30 Jahren . .	7	36,8 %
Ohne Angabe . . .	2	

Am meisten gefährdet bei Infektion erscheinen demnach die jüngeren Mehrgebärenden zu sein.

Der Geburtsverlauf bei den Infektionstodesfällen war folgender:

Spontan	11 = 55%
Operativ	9 = 45%
Unbekannt	1

Bei den 9 operativ entbundenen Frauen wurden folgende Operationen ausgeführt:

Zange	2
Wendung ev. mit Exstruktion . .	2
Perforation, Dekapitation usw. .	2
Manuelle Plazentarlöfung . . .	2
Exstruktion	1

Wenn auch wohl die Operation an sich die tödlichen Bakterien nicht ausschließlich in den mütterlichen Körper gebracht haben müssen, so können sie doch günstige Vorbedingungen für die Infektion geschaffen haben. Es ist daher wohl angängig, aus der Häufigkeit der nach Operationen erfolgten Infektionstodesfälle eine bestimmte Infektionsgefahr für die einzelnen Operationen abzuleiten. Die diesbezügliche Berechnung ergibt:

Zange	0,8%
Wendung ev. mit Exstruktion . .	1,7%
Perforation, Dekapitation usw. .	6,6%
Manuelle Plazentarlöfung . . .	10,5%
Exstruktion	1,0%

Dabei bestätigt sich die schon allgemein bekannte Tatsache, daß die manuelle Plazentarlöfung die größten Gefahren für die Infektion birgt.

Den zweitgrößten Anteil an der Mortalitätshöhe hat der Tod infolge Eklampsie.

In dem fünfjährigen Zeitabschnitt kamen 43 Eklampsiefälle zur Behandlung. Von allen aufgenommenen Frauen waren also 0,66% eklamptisch.

Von diesen 43 Frauen starben 9 oder 20,9% der Erkrankten.

Von allen Verstorbenen aber 16% (vergl. auch die graphische Beilage).

Von den Erkrankten waren:

Erstgebärende 22 = 50,6%

Mehrgebärende 20 = 46%

Ohne Angabe 1

Eine besondere Prädisposition Erstgebärender ist daraus nicht zu nehmen.

Von den Gestorbenen waren:

Erstgebärende 4 = 44,4%

Mehrgebärende 5 = 55,6%

Je nach dem Auftreten des ersten Anfalles war die Eklampsie bei den Verstorbenen zu bezeichnen als:

Eklampsia gravidarum 3

Eklampsia gravidarum et parturientium 2

Eklampsia gravidarum, parturientium et puerperarum 4

Der Geburtsverlauf war:

Spontan 2

Operativ 4

Unentbunden 3

An Operationen wurden ausgeführt:

Zange 2

Wendung und Extraktion 1

Sectio caesarea 1

Als dritte Todesursache wollen wir noch die Uterusruptur anführen. Es starben daran 9 Frauen = 0,14% der Frequenz. 2 Fälle wurden mit der Ruptur eingeliefert, fallen daher der Klinik nicht zur Last. Bei einem Fall fehlt die Krankengeschichte. Dadurch wird der Prozentsatz herabgemindert auf 0,09%.

Von diesen Frauen waren:

Erstgebärende —

Mehrgebärende 7

Ohne Angabe 2

Dem Alter nach waren:

Unter 30 Jahren 3

Über 30 Jahren 4

Ohne Angabe 2

Die Geburten waren:

Spontan	2
Operativ	6
Unbekannt	1

Die ausgeführten Operationen sind:

Zange	3
Wendung und Extraktion	2
Perforation und Kranioklasie . . .	1
Künstliche Frühgeburt	1
Laparotomie	1

Die Rupturen waren:

Violent	3
Spontan	5
Unbekannt	1

Der zweite Abschnitt ist gerechnet vom 1. Januar 1902 bis 1. Oktober 1907.

In dieser Zeit wurden in der geburtshilflichen Abteilung der Münchener Universitäts-Frauenklinik (ohne Hebammenschule) entbunden:

6964 Frauen.

Ganz oder zum Teil entbunden eingeliefert wurden:

358 Frauen.

Im ganzen erfolgten also 7322 Aufnahmen.

Auf die einzelnen Jahre verteilen sich diese in folgender Weise.

Jahre:	Geburten:
1902	1343
1903	1314
1904	1099
1905	1297
1906	1295
1907 bis 1. Oktober	974

Von diesen Frauen waren (soweit Angaben vorhanden):

Erstgebärende . . .	3216 = 48,29%
Mehrgebärende . . .	3444 = 51,71%.

Dem Alter nach waren:

Unter 30 Jahren . .	5375 = 80,71%
Über 30 Jahren . .	1285 = 19,29%.

Von den 7322 Frauen starben 55.

Dies entspricht einer Mortalität von 0,75 %.

Auf die einzelnen Jahre verteilen sich die Todesfälle in folgender Weise:

Jahre:	Geburten:	Todesfälle:	Mortalität:
1902	1343	13	0,97 %
1903	1314	6	0,46 %
1904	1699	9	0,82 %
1905	1297	12	0,93 %
1906	1295	7	0,54 %
1907 bis 1. X.	974	8	0,82 %

(Vergl. graphische Darstellung.)

Als Todesursachen kommen in Betracht:

Sepsis	21
Eklampsie	10
Uterusruptur	5
Verblutungen infolge von Placenta praevia	6
Atonia uteri	3
Nephritis	1
Komplikationen	5
Nach Operationen	4

Auf die einzelnen Jahre verteilen sich die einzelnen Todesfälle und machen von der Frequenz in Prozents aus:

	im Jahre									
	1902	%	1903	%	1904	%	1905	%	1906	%
Geburten . . .	1343	—	1314	—	1099	—	1297	—	1295	—
Sepsis	5	0,37	4	0,30	2	0,18	4	0,31	2	0,15
Eklampsie . . .	3	0,22	1	0,08	—	—	2	0,15	3	0,23
Uterusruptur .	1	0,07	—	—	1	0,09	—	—	2	0,15
Placenta praev.	1	0,07	—	—	2	0,18	2	0,15	—	—
Atonia uteri .	1	0,07	1	0,08	—	—	—	—	—	—
Nephritis . . .	—	—	—	—	—	—	1	0,08	—	—
Komplikationen.	1	0,07	—	—	2	0,18	2	0,15	—	—
Nach Operationen	1	0,07	—	—	2	0,18	1	0,08	—	—

Von den 55 Frauen waren:

Erstgebärende 15 = 27,3 %

Mehrgebärende 40 = 72,7 %

Dem Alter nach waren:

Unter 30 Jahren . . . 29 = 52,7 %

Über 30 Jahre . . . 26 = 47,3 %

Nach dem Zeitpunkt des Todes geordnet verschieden:

Unentbunden 8

Wenige Stunden nach der Geburt 15

In puerperio 31

Ohne Krankengeschichte . . . 1

In der Zeit vom 1. Januar 1902 bis 1. Oktober 1907 wurden 668 größere Operationen ausgeführt.

Die Operationsfrequenz betrug 9,1 %.

Die ausgeführten Operationen waren:

Forceps 203

Wendung ev. mit Extraktion 136

Perforation, Dekapitation, Kranioklasie ufw. 70

Künstliche Frühgeburt 21

Pubiotomie 8

Sectio caesarea, Laparotomie mit oder ohne

Totalextirpation 24

Manuelle Plazentarlösung 44

Extraktion 152

Bei den 55 gestorbenen Frauen wurden folgende Operationen ausgeführt:

Forceps 4

Wendung ev. mit Extraktion . . . 8

Perforation 2

Künstliche Frühgeburt 1

Kaiserschnitt, Laparotomie 8

Manuelle Plazentarlösung 9

Extraktion 2

Bei den Verstorbenen ergibt sich daraus eine Operationsfrequenz von 61,8 %.

Die Mortalität aller Operierten betrug 5 %.

Auch in diesem Abschnitt wollen wir die an Sepsis, Eklampsie und Uterusruptur verstorbenen Frauen näher betrachten.

Dem Wochenbettfieber fielen während der fünf Jahre 21 Frauen zum Opfer;

von der Gesamtfrequenz 0,29 %

von den Verstorbenen überhaupt 38,2 %.

Also sind auch in diesem Abschnitte bei weitem am meisten Frauen an Puerperalfieber gestorben. (Vergl. graphische Darstellung).

Von diesen 21 Frauen waren aber bereits bei ihrer Einlieferung 5 als infiziert zu betrachten, können also nicht auf Rechnung der Anstalt gebracht werden.

Dadurch ermäßigt sich die Infektionsmortalität der Anstalt auf 0,22%.

Von den verstorbenen Müttern waren:

Erstgebärende 5 = 24 %

Mehrgebärende 15 = 72 %

Ohne Angabe 1

Dem Alter nach waren:

Unter 30 Jahren . . 12 = 57,6 %

Über 30 Jahre . . . 8 = 38,4 %

Ohne Angabe . . . 1

Die jüngeren Mehrgebärenden zeigen auch in diesem Abschnitte eine Bevorzugung bei schweren Infektionen.

Der Geburtsverlauf bei den Infektionstodesfällen war:

Spontan 11 = 52,8

Operativ 9 = 43,2

Unbekannt 1

Die ausgeführten Operationen waren folgende:

Forceps 1

Wendung mit Extraktion 3

Perforation, Dekapitation usw. . . 2

Manuelle Plazentarlösung 4

Für die Infektionsgefahr der einzelnen Operationen ergibt die Berechnung:

Zange 0,5 %

Wendung mit Extraktion . . 2,2 %

Perforation, Dekapitation . . 2,8 %

Manuelle Plazentarlösung . . 9 %

Auch hier die Bestätigung für die hohe Infektionsgefahr der manuellen Plazentalöfung.

An Eklampsie erkrankten vom 1. Januar 1902 bis 1. Oktober 1907 31 Frauen = 0,42 der aufgenommenen.

Von diesen 31 Frauen starben 10 = 32 % der Erkrankten.

Von der Gesamtheit starben an Eklampsie: 0,14 %.

Von den Gestorbenen hatten als Todesursache Eklampsie: 18 %. (Vergl. Beilage.)

Von den 31 Erkrankten waren:

Erstgebärende	20 = 64 %
Mehrgebärende	9 = 28 %
Ohne Angabe	2

Es bestätigt sich die Tatsache, daß Erstgebärende besonders häufig von Eklampsie befallen werden.

Von den 10 Verstorbenen waren:

Erstgebärende	4 = 40 %
Mehrgebärende	4 = 40 %
Ohne Angabe	2

Dem Alter nach waren:

Unter 30 Jahren	5 = 50 %,
Über 30 Jahre	3 = 30 %
Ohne Angabe	2

Je nach dem Auftreten des ersten Anfalles war die Eklampsie bei den Verstorbenen zu bezeichnen als:

Eklampsia gravidarum	3
„ puerperarum	2
„ gravid. et parturientium . . .	2
„ gravid. partur. et puerperarum	3

Der Geburtsverlauf war:

Spontan	4
Operativ	3
Unentbunden	3

An Operationen wurden ausgeführt:

Lange	1
Wendung mit Exstruktion	2

Zum Schluß wollen wir noch auf die Uterusruptur etwas eingehen.

In dem fünfjährigen Zeitraum kamen 8 Uterusrupturen zur Behandlung; davon starben 5 oder 62,5 % der Erkrankten.

Von allen eingelieferten Frauen starben an Uterusruptur 0,07 %.

Von den 55 Verstorbenen 9 %.

Von den 5 Frauen waren:

Erstgebärende	—
Mehrgebärende	4
Ohne Krankengeschichte	1

Dem Alter nach waren:

Unter 30 Jahren	1
Über 30 Jahre	3
Ohne Krankengeschichte	1

Der Geburtsverlauf war:

Spontan	1
Operativ	3
Unbekannt	1

Operationen wurden folgende ausgeführt:

Wendung mit Exstruktion	2
Perforation	1

Die Rupturen waren:

Violent	1
Spontan	2
Unbekannt	1

Der dritte Abschnitt läuft vom 1. Oktober 1907 bis 31. Dezember 1911. In dieser Zeit wurden auf der geburts-hilflichen Abteilung der Münchener Universitäts-Frauenklinik (ohne Hebammenchule) entbunden:

6990 Frauen.

Ganz oder zum Teil entbunden eingeliefert wurden:

154 Frauen.

Im ganzen erfolgten also

7144 Aufnahmen.

Auf die einzelnen Jahre verteilen sich diese in folgender Weise:

Jahre:	Geburten:
1907 1. X.—31. XII.	305
1908	1484
1909	1595
1910	1803
1911	1957

Von diesen Frauen waren (soweit Angaben vorhanden)

Erstgebärende . . . 3345 = 46,8%

Mehrgebärende . . 3787 = 53,2%

Dem Alter nach waren:

Unter 30 Jahren . . 5905 = 82,7%

Über 30 Jahre . . 1239 = 17,3%

Von den Erstgebärenden waren 130 über 30 Jahre — 3,9%
der Erstgebärenden.

Von den 7144 Frauen starben 59.

Die Mortalität betrug 0,84%.

Auf die einzelnen Jahre verteilen sich die Todesfälle in folgender Weise:

Jahre:	Geburten:	Todesfälle:	Mortalität:
1907 1. X.—31. XII	305	2	0,66%
1908	1484	14	0,98%
1909	1595	15	0,9%
1910	1803	7	0,42%
1911	1957	21	1,05%

Als Todesursachen kommen in Betracht:

Sepsis 21

Eklampsie 12

Uterusruptur 8

Verblutung infolge von Placenta praevia . . . 5

Atonia uteri 2

Miliartuberkulose 1

Komplikationen 5

Nach Operationen 5

Auf die einzelnen Jahre verteilen sie sich und machen von der Frequenz in Prozent aus:

	Im Jahre									
	1907	%	1908	%	1909	%	1910	%	1911	%
Geburtenzahl	305	—	1484	—	1595	—	1803	—	1957	—
Sepsis	1	0,33	4	0,28	4	0,24	3	0,18	9	0,45
Eklampsie	—	—	2	0,14	8	0,48	—	—	2	0,10
Uterusruptur	—	—	2	0,14	1	0,06	2	0,12	3	0,15
Placenta praevia . . .	—	—	2	0,14	—	—	1	0,06	2	0,10
Atonia uteri	—	—	—	—	1	0,06	—	—	1	0,05
Miliartuberkulose . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,05
Komplikationen . . .	—	—	2	0,14	1	0,06	1	0,06	1	0,05
Nach Operationen . .	1	0,33	2	0,14	—	—	—	—	2	0,10

Von den 59 Verstorbenen waren:

Erstgebärende 19 = 32,3 %

Mehrgebärende 37 = 62,9 %

Ohne Angabe 3

Auch hier die Tatsache, daß die Mehrgebärenden stark überwiegen.

Dem Alter nach waren:

Unter 30 Jahren 29 = 47,3 %

Über 30 Jahre 26 = 42,2 %

Ohne Angabe 4

Nach dem Zeitpunkte des Todes zur Geburt geordnet verschieden:

Unentbunden 2 = 3,4 %

Wenige Stunden nach der Geburt 19 = 32,3 %

In puerperio 36 = 61,2 %

Ohne Krankengeschichte . . . 2

Um wieder auf die Wechselbeziehungen zwischen Mortalität und Operationsfrequenz einzugehen, so wurden vom 1. Oktober 1907 bis 31. Dezember 1911 an der Münchener Frauenklinik 1142 größere Operationen ausgeführt.

Dies ergibt eine Operationsfrequenz von 15,9 %. Die Operationen waren folgende:

Forceps 227

Episiotomie 47

Wendung ev. mit Extrakzion . . . 144

Extraktion	189
Perforation, Dekapitation, Kranioklasie	97
Hebosteotomie	133
Laparotomie	17
Sectio caesarea	36
Künstliche Frühgeburt	48
Manuelle Plazentalöfung	112
Curettement	64
Nierendecapsulation	2

Bei den 59 verstorbenen Frauen wurden folgende größere Operationen ausgeführt:

Forceps	6
Epifiotomie	1
Wendung mit Extraktion	14
Extraktion	1
Perforation, Dekapitation usw.	8
Hebosteotomie	3
Hysteroftomatomie	10
Kaiserschnitt	4
Laparotomie	7
Manuelle Plazentalöfung	5

Das ergibt für die Verstorbenen eine Operationsfrequenz von 100 %.

Von den drei Todesursachen, die wir einer eingehenden Besprechung unterziehen wollen, forderte wieder die meisten Opfer die puerperale Infektion.

Vom 1. Oktober 1907 bis 31. Dezember 1911 erlagen 21 Frauen dem Puerperalfieber.

Von der Gesamtheit 0,29 %

Von den Gestorbenen 35,6 %

(Vergl. graphische Beilage).

7 Frauen waren schon bei ihrer Aufnahme in die Klinik infiziert.

Dadurch ermäßigt sich die Infektionsmortalität der Anstalt auf 0,19 %.

Von den 21 Frauen waren:

Erstgebärende	5 = 24 %
Mehrgebärende	15 = 72 %
Ohne Angabe	1

Der Geburtsverlauf war bei den 21 Geburten folgender:

Spontan	10 = 48 %
Operativ	8 = 38,4 %
Ohne Angabe	3

Bei den operativ entbundenen Frauen wurden folgende Operationen ausgeführt:

Wendung mit Extraktion	1
Extraktion	1
Perforation, Kranioklasie	2
Hebosteotomie	1
Hysteroftomatomie	2
Sectio caesarea	3
Manuelle Plazentarlösung	3

Berechnet man wieder die Infektionsgefahr für die einzelnen Operationen, so würde sich für diesen Abschnitt ergeben:

Wendung und Extraktion . .	0,69 %
Extraktion	0,53 %
Perforation, Kranioklasie . .	2,1 %
Hebosteotomie	3,8 %
Hysteroftomatomie	1,5 %
Sectio caesarea	8,3 %
Manuelle Plazentarlösung . .	4,7 %

In diesem Abschnitt erweist sich als gefährlichste Operation bezüglich der Infektion der Kaiserschnitt. Dann aber die manuelle Plazentarlösung.

An zweiter Stelle steht der Höhe nach wieder die Eklampsie. Während der fünf Jahre kamen 54 Eklampsiefälle zur Behandlung. Das ist 0,75 % der Frequenz.

Davon starben 12 Frauen = 22,2 % der Erkrankten.

Von allen Verstorbenen aber 20,3 %.

(Siehe graphische Beilage).

Von den Erkrankten waren:

Erstgebärende	23 = 70,4 %
Mehrgebärende	12 = 22,2 %
Ohne Angabe	4

Hieraus erficht man wieder eine deutliche Bevorzugung der Erstgebärenden.

Von den Gestorbenen waren:

Erstgebärende	6 = 50 %
Mehrgebärende	4 = 33,3 %
Ohne Angabe	2

Dem Alter nach:

Unter 30 Jahren	7 = 58,3 %
Über 30 Jahre	3 = 25 %
Ohne Angabe	2

Je nach dem Auftreten des ersten Anfalles zum Zeitpunkte der Geburt:

Eklampsia gravidarum	2
„ parturientium	1
„ puerperarum	2
„ gravidarum et parturientium	4
„ parturientium et puerperarum	1
„ gravidarum, parturientium et puerperarum	2

Der Geburtsverlauf war:

Spontan	2
Operativ	7
Unentbunden	1
Ohne Angabe	2

Bei den 7 operativ entbundenen Frauen wurden folgende Operationen ausgeführt:

Zange	2
Wendung ev. mit Extraktion	5
Perforation	1
Hysteroftomatomie	5
Manuelle Plazentalöfung	2

Vom 1. Oktober 1907 bis 31. Dezember 1911 wurden in der Münchener Frauenklinik 14 Frauen mit Uterusruptur behandelt. Von diesen starben 8 Frauen = 57,1% der Erkrankten.

Von der Frequenz 0,11%,

Von den Gestorbenen 13,6%.

5 Frauen wurden bereits mit Rupturen eingeliefert, sind also nicht auf Rechnung der Anstalt zu setzen.

Dadurch ermäßigt sich die Mortalität auf 0,04%.

Von den 8 in der Anstalt an Uterusruptur Gestorbenen waren:

Erstgebärende	—
Mehrggebärende	8
Dem Alter nach waren:	
Unter 30 Jahren	3
Über 30 Jahre	5
Der Geburtsverlauf war:	
Spontan	—
Operativ	5
Ohne Angabe	3
Zur Ausführung kamen folgende Operationen:	
Zange	1
Wendung mit Extraktion	2
Perforation	3
Laparotomie	6
Die Rupturen waren:	
Violent	5
Spontan	1
Ohne Angabe	2

Um eine klare Übersicht über das Verhalten der einzelnen Ziffern in den drei Abschnitten zu bekommen, sollen sie noch einmal kurz gegenübergestellt werden.

	1897—1901	1902 b. 1. X. 1907	X, 1907—1911
Zahl der Geburten	6490	7322	7144
Prozente der Erstgebärenden	48,3%	48,20%	46,8%
Prozente der Mehrggebärenden	51,7%	51,71%	53,2%
Todesfälle	56	55	59

	1897—1901	1902 b. l. X. 1907	X. 1907—1911
Gesamtmortalität in Prozent	0,8 ‰	0,75 ‰	0,84 ‰
Mortalität auf Rechnung der Anstalt in Prozent . . .	0,66 ‰	0,68 ‰	0,67 ‰
Operationsfrequenz . . .	8,6 ‰	9,1 ‰	15,9 ‰
Operationsfrequenz bei den Gestorbenen	47 ‰	61,8 ‰	100 ‰
Mortalität der Operierten .	4,7 ‰	5,0 ‰	5,1 ‰
An Sepsis starben in ‰ der Frequenz	0,32 ‰	0,29 ‰	0,29 ‰
Auf Rechnung der Anstalt sind zu setzen	0,23 ‰	0,22 ‰	0,19 ‰
In München starben an Sepsis in ‰ der Geburten . . .	0,17 ‰	0,18 ‰	0,22 ‰
In Bayern starben an Sepsis in ‰ der Geburten . . .	0,15 ‰	0,16 ‰	0,16 ‰
An Eklampsie erkrankten in ‰ der Frequenz	0,66 ‰	0,42 ‰	0,75 ‰
An Eklampsie starben in ‰ der Frequenz	0,14 ‰	0,14 ‰	0,16 ‰
Von den Erkrankten starben	20,9 ‰	32 ‰	22,2 ‰
An Uterusruptur starben . .	0,14 ‰	0,07 ‰	0,11 ‰
Auf Rechnung der Anstalt sind zu setzen	0,09 ‰	0,07 ‰	0,04 ‰

Aus dieser Gegenüberstellung lassen sich für die Zeitdauer 1907 bis 1912 in Kürze folgende Sätze aufstellen:

Die Erstgebärenden nehmen ab, die Mehrgebärenden, die mehr Geburtskomplikationen aufzuweisen haben, nehmen stetig zu.

Die Operationsfrequenz sowohl im allgemeinen als bei den Gestorbenen nimmt ganz gewaltig zu.

Die Mortalität im allgemeinen zeigt eine kleine Steigerung, die Anstaltsmortalität bleibt gleich.

Den Hauptanteil an der Mortalität nehmen die an Sepsis zugrunde gegangenen Wöchnerinnen ein. Die Todesfälle selbst halten während der 15 Jahre ungefähr die gleiche Höhe ein; die auf Rechnung der Anstalt zu setzenden zeigen aber ein deutliches Abflinken, besonders in den letzten 5 Jahren.

Befonders günstig ist ein Vergleich der Infektionsmortalität der Klinik mit der Münchens und Bayerns.

Zu diesem Zweck sind die Tafeln III u. IV beigegeben. Aus diesen geht hervor, daß die Infektionsmortalität stetig sinkt und zwar im letzten Jahre so, daß sie tiefer steht als die Münchens und Bayerns.

Bei den bekannt ungünstigen Verhältnissen einer Klinik im allgemeinen, besonders aber einer Universitätsklinik müssen die gefundenen Zahlen als ausgezeichnet betrachtet werden, besonders im letzten Abschnitt, in dem die Anstaltsmortalität geringer ist als die Münchens.


Fassen wir die aus dem Vorausgehenden gewonnenen Resultate zusammen, so kommen wir zu dem Schlusse, daß die Mortalität in den letzten 5 Jahren um einige hundertstel Prozent gestiegen ist. Als Ursache dafür kann man mit Recht die Änderung im Krankenmaterial ansehen. Als sichere Anhaltspunkte dienen uns dafür das bedeutende Überwiegen der Mehrgebärenden und die große Zunahme der Operationsfrequenz.

Noch mehr kommt man zu der Überzeugung, daß die Schuld für das Steigen der Mortalitätsziffer nicht in der Anstalt selbst liegt, wenn man sieht, daß auf allen Gebieten die Anstaltsmortalität gesunken ist.

Zieht man dies alles in Betracht, so kann man wohl mit Recht annehmen, daß sich die Mortalitätsverhältnisse in den letzten 5 Jahren in Wirklichkeit günstiger gestaltet haben.



Kurve der Geburtsfrequenz der Münchener Frauenklinik in den Jahren 1897—1911.




Todesfälle in den Jahren 1897—1911

in % der Frequenz.

Mortalitäts-Kurve

Kurve der Puerperal-

und Eklampsie-Todesfälle.



Sterbefälle an Kindbettfieber in München von 1897—1910


in ‰ auf 10 000 Geburten.

Kurve - - - - -

Sterbefälle an Kindbettfieber in der Münchener Klinik 1897—1910

in ‰ der Frequenz.

Kurve —————



Sterbefälle an Kindbettfieber in Bayern von 1897—1910


in ‰ auf 10 000 Geburten.

Kurve - - - - -

Sterbefälle an Kindbettfieber in der Münchener Klinik 1897—1910.

in ‰ der Frequenz.

Kurve —————



Literatur.

Wilms. Die puerperalen Todesfälle der M. Fr.-Kl. 1897—1907.

Krings. Tod der Mütter in der M. Fr.-Kl. 1883 bis 1. Oktbr. 1907.

Lebenslauf.

Philipp Wehner wurde am 12. Juli 1888 zu Werneck in Bayern geboren. Er ist katholisch. Die Volksschule wie das Gymnasium besuchte er in München. Das Zeugnis der Reife erhielt er im Sommer 1907. Im darauffolgenden Herbst bezog er die Universität München und widmete sich dem Studium der Medizin. Im Sommersemester 1910 bestand er das Physikum und im Dezember 1912 das Staatsexamen, beides in München.
